

Contact

Heeft u vragen over dit onderzoek, neem dan contact op met uw behandelende arts.

Dienst endocrinologie

03 821 32 75

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be
Volg ons op facebook  en twitter 



Het UZA draagt het JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

UZA'

Schildklierpunctie

Fine needle aspiration cytology (FNAC)

Informatiebrochure patiënten

© UZA, juni 2018. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming endocrinologie 2349830



Kennis / Ervaring / Zorg

UZA'

Beste patiënt

Er werd bij u een zwelling in de schildklier (nodule of cyste) vastgesteld. Daarom ondergaat u een schildklierpunctie. Zo kunnen we de aard van de zwelling vaststellen. De arts verzamelt hiervoor met een prik (punctie) in de zwelling een kleine hoeveelheid schildkliercellen. De patholoog onderzoekt deze cellen vervolgens onder de microscoop.

Hoe verloopt het onderzoek?

U maakt uw hals vrij. De arts voelt aan de zwelling in de hals om de grootte, structuur en beweeglijkheid vast te stellen.

Blijf tijdens het aanprikken van de zwelling zo stil mogelijk liggen en probeer niet te slikken. De arts vraagt u op voorhand enkele keren te slikken zodat u tijdens de procedure minder slikneigingen heeft. U mag wel gewoon doorademen.

De arts houdt de zwelling vast en prikt er in met een dunne naald die gekoppeld is aan een spuit. De punctie kan gevoelig zijn, maar plaatselijke verdoving is meestal niet nodig. De arts maakt kleine bewegingen met de naald in verschillende richtingen. Zo worden de schildkliercellen verzameld.

- Als de zwelling veroorzaakt wordt door **vocht** (een cyste), komt eerst een kleine hoeveelheid (soms bloederig) vocht vrij. Na het leegzuigen van de cyste, wordt dan meteen een tweede punctie uitgevoerd om voldoende schildkliercellen te verzamelen.

- Bij een **vaste nodule** (bolletje in de schildklier) wordt twee keer geprikt om voldoende beoordeelbaar schildklier materiaal te hebben.

De procedure neemt slechts enkele minuten in beslag.

Als de punctie niet voldoende materiaal heeft opgeleverd om een diagnose te stellen, wat voorkomt in 8 tot 20% van de gevallen, dan wordt het onderzoek later nog eens herhaald. De definitieve uitslag van dit onderzoek krijgt u van uw behandelende endocrinoloog. Hiervoor komt u langs op de consultatie. De behandelend arts bespreekt met u dan het verdere verloop.

Mogelijke complicaties

Het onderzoek verloopt meestal probleemloos. In uitzonderlijke gevallen kunnen onderstaande complicaties optreden:

- De punctieplaats kan gevoelig zijn en er kan een zwelling in de hals ontstaan. Dit gaat meestal vanzelf over.
- Zelden ontstaat een plaatselijke bloeding. De kans op een bloeding is groter bij ziekten met verhoogde bloedingsneiging of bij gebruik van bepaalde medicatie (bloedverdunners). Als u deze medicatie gebruikt, overleg vooraf met uw behandelend arts of deze enkele dagen voor de punctie gestaakt kunnen worden.

Indien u andere klachten ondervindt, meld dit onmiddellijk aan uw behandelend arts.